

RAPPORT FRA TAKSERING AV RYPER VINGELEN 2014

Taksering ble gjennomført 9. og 10. august i Gjersjødøa og 17. til 20. august i Ørvilldalen.

Ansvarlig for takseringa: Per Østigård

Antall linjer i Gjersjødøa 6
Linjemeter taksert 19 600

Antall linjer i Ørvilldalen 7
Linjemeter taksert 28 000


Værforholdene var delvis krevende med tanke på hundenes arbeidsforhold under takseringa i Ørvilldalen. Dette på grunn av nedbør og tåke. Av den årsak ble takseringa gjennomført over fire dager i stedet for det vanlige som er to. Under takseringa i Gjersjødøa var det krevende forhold pga. høy temperatur og lite vind.

Vi fant store kull i begge takseringsområdene. I begge områdene fant vi omlagte kull, men ikke mer enn normalt.

Det ble observert mye mus og lemen. Det ble også observert svært mye rovfugl.


Statistikdata for Ørvilldalen

År	Antall observasjoner	Antall voksne	Antall kyllinger	Antall ryper	Ryper pr. taksert 1000 m	Ryper pr. km ²	Kyllinger pr. voksent par
2002	37	46	133	179	6,3	36	5,8
2003	74	94	232	326	11,5	68	4,9
2004	93	121	335	456	16,3	89	5,5
2005	104	130	361	491	17,5	86	5,6
2006	61	88	275	363	13,0	60	6,3
2007	95	140	581	721	25,8	152	8,3
2008	99	149	357	506	18,1	79	4,8
2009	34	57	67	124	4,4	11	2,4
2010	38	63	211	274	9,8	40	6,7
2011	77	134	525	659	23,5	87	7,8
2012	76	119	141	260	9,3	34	2,4
2013	66	72	318	390	13,9	42	8,8
2014	51	84	294	378	13,5	52	7,0



Statistikdata for Gjersjøhøa

År	Antall observasjoner	Antall voksne	Antall kyllinger	Antall ryper	Ryper pr. taksert 1000 m	Ryper pr. km ²	Kyllinger pr. voksent par
2012	21	30	48	78	5,3	23	3,2
2013	33	42	131	173	8,8	33	6,2
2014	31	41	177	218	11,1	44	8,6



Taksørenes vurdering:

13 år med systematisk rypetaksering i Vingelen viser at de årlige svingningene er store. Området har gjennomgående en svært god bestand av liryper. En sammenligning med takseringsresultatene i øvrige deler av landet bekrefter dette.

Reproduksjon

For begge områdene ligger reproduksjonen over gjennomsnittet fra tidligere tellinger og det er observert mange store kull. I Gjersjøhøa er reproduksjonen svært god. Den gode smånagerbestanden bidrar til lav predasjon fra rovdyr og er derfor en viktig årsak til god reproduksjon. Predasjonen kan likevel øke utover høsten pga. svært mye rovfugl i fjellet. Det ser ikke ut til at dårlig vær i selve klekkeperioden har satt overlevelsen nevneverdig tilbake. Tidlig vår med mye insekter fram mot klekkinga har kanskje bidratt positivt.

Bestandsvurdering

I Ørvilldalen ligger årets totale rypebestand på gjennomsnittet for tolvårsperioden med taksering, og ganske likt med fjoråret. Stamfuglbestanden er noe svakere enn periodegjennomsnittet. En god reproduksjon gir likevel et gjennomsnittlig godt rypeår

I Gjersjøhøa er statistikkgrunnlaget, med tre år taksering, for lite til å konkludere sikkert om hvor årets bestand ligger i forhold til et normalsnitt for området. Utviklingen i treårsperioden er god.

19. august 2013

Per Østigård