

RAPPORT FRA TAKSERING AV RYPER VINGELEN 2013

Takseringen ble i år utvidet med 2 nye linjer i Gjersjøhøa, en økning på 4,9 km.

Takseringen ble gjennomført 10. august i Gjersjøhøa og 17. til 18. august i Ørvilldalen.

Ansvarlig for takseringen: Per Østigård

Antall linjer i Gjersjøhøa 6
Linjemeter taksert 19 580

Antall linjer i Ørvilldalen 7
Linjemeter taksert 28 000

Værforholdene var gode med tanke på hundenes arbeidsforhold under takseringen i Ørvilldalen og litt vanskeligere under takseringen i Gjersjøhøa.


Vi fant store kull i begge takseringsområdene. I Ørvilldalen var kyllingene store og nesten uten innslag av ”pipkyllinger”. I Gjersjøhøa var innslaget av omlagte kull litt større.

Det ble observert få smågnagere. Det ble observert mer rovfugl enn forrige år.

Statistikdata for Ørvilldalen

År	Antall observasjoner	Antall voksne	Antall kyllinger	Antall ryper	Ryper pr. taksert 1000 m	Ryper pr. km ²	Kyllinger pr. voksent par
2002	37	46	133	179	6,3	36	5,8
2003	74	94	232	326	11,5	68	4,9
2004	93	121	335	456	16,3	89	5,5
2005	104	130	361	491	17,5	86	5,6
2006	61	88	275	363	13,0	60	6,3
2007	95	140	581	721	25,8	152	8,3
2008	99	149	357	506	18,1	79	4,8
2009	34	57	67	124	4,4	11	2,4
2010	38	63	211	274	9,8	40	6,7
2011	77	134	525	659	23,5	87	7,8
2012	76	119	141	260	9,3	34	2,4
2013	66	72	318	390	13,9		8,8


*Ryper pr. km² blir beregnet av høgskolen på Evenstad via dataprogrammet ”Distance sampling”. Resultatet fra denne beregningen foreligger ikke ennå.



Statistikdata for Gjersjøhøa

År	Antall observasjoner	Antall voksne	Antall kyllinger	Antall ryper	Ryper pr. taksert 1000 m	Ryper pr. km ²	Kyllinger pr. voksent par
2012	21	30	48	78	5,3	23	3,2
2013	33	42	131	173	8,8		6,2

*Ryper pr. km² blir beregnet av høgskolen på Evenstad via dataprogrammet "Distance sampling". Resultatet fra denne beregningen foreligger ikke ennå.



Taksørenes vurdering:

12 år med systematisk rypetaksering i Ørvilldalen viser at de årlige svingningene er store. Området har i norsk sammenheng gjennomgående en svært god bestand av liryper. En sammenligning med takseringsresultatene i øvrige deler av landet bekrefter dette.

Kyllingproduksjon

For Ørvilldalen er produksjonen oppsiktsvekkende bra og 2013 er det beste produksjonsåret etter at systematisk taksering ble iverksatt. For Gjersjøhøa er dette det andre året med taksering, men også her er kyllingproduksjonen bedre enn i et normalår. At kyllingproduksjonen er så god på tross av en relativt liten smågnagerbestand er overraskende. Gode værforhold under vår og forsommer må ha bidratt positivt.

Bestandsvurdering

I Ørvilldalen ligger årets totale rypebestand på gjennomsnittet for tolvårsperioden med taksering. På grunn av et dårlig år i 2012 var det få stamfugler i vår. Dermed er årets takseringsresultat det beste vi kunne håpe på. Resultatet for Ørvilldalen er noe bedre enn for Gjersjøhøa. Dette skyldes hovedsakelig forskjeller i biotop der takseringen foregår. At forholdene for hundene var best under takseringen i Ørvilldalen samt mulige forskjeller i predasjonspress kan også virke inn.

På Gjersjøhøa vil vi anslå at årets bestand ligger på gjennomsnittsnivå for området, men her trenger vi flere år med takseringsdata for å konkludere sikkert.

19. august 2013

Per Østigård