

RAPPORT FRA TAKSERING AV RYPER VINGELEN 2016

Taksering ble gjennomført 6. og 7. august i Gjersjøhøa og 13. til 14. august i Ørvilldalen.

Antall linjer i Gjersjøhøa 6
Linjemeter taksert 19 600


Antall linjer i Ørvilldalen 7
Linjemeter taksert 28 000

Værforholdene har i hele takseringsperioden vært bra med tanke på hundenes muligheter for å finne rypene.

Takseringa viser en god bestand av voksenfugl og en svært god produksjon av kyllinger. I begge områdene ble det registrert noen kull med små kyllinger som stammer fra omlagte kull. Det store bildet er likevel entydig positivt med mange og til dels store kyllinger i hvert kull. Det ble observert svært få smånagere. Det ble observert usedvanlig få rovfugl.


Statistikdata for Ørvilldalen

År	Antall observasjoner	Antall voksne	Antall kyllinger	Antall ryper	Ryper pr. taksert 1000 m	Ryper pr. km ²	Kyllinger pr. 2 voksne
2002	37	46	133	179	6,3	36	5,8
2003	74	94	232	326	11,5	68	4,9
2004	93	121	335	456	16,3	89	5,5
2005	104	130	361	491	17,5	86	5,6
2006	61	88	275	363	13,0	60	6,3
2007	95	140	581	721	25,8	152	8,3
2008	99	149	357	506	18,1	79	4,8
2009	34	57	67	124	4,4	11	2,4
2010	38	63	211	274	9,8	40	6,7
2011	77	134	525	659	23,5	87	7,8
2012	76	119	141	260	9,3	34	2,4
2013	66	72	318	390	13,9	42	8,8
2014	51	84	294	378	13,5	52	7,0
2015	77	119	159	278	9,9	38	2,7
2016	88	127	567	694	24,8		8,9



Statistikdata for Gjersjøhøa

År	Antall observasjoner	Antall voksne	Antall kyllinger	Antall ryper	Ryper pr. taksert 1000 m	Ryper pr. km ²	Kyllinger pr. 2 voksne
2012	21	30	48	78	5,3	23	3,2
2013	33	42	131	173	8,8	33	6,2
2014	31	41	177	218	11,1	44	8,6
2015	41	60	68	128	6,5	27	2,3
2016	43	58	239	297	15,2		8,2



Taksørenes vurdering:

15 år med systematisk rypetaksering i Vingelen viser at de årlige svingningene er store. Området har likevel gjennomgående en svært god bestand av liryper. En sammenligning med takseringsresultatene i øvrige deler av landet bekrefter dette.

Reproduksjon/overlevelse

Godt vær på forsommeren har medvirket til en svært god kyllingproduksjon. Smågnagerbestanden er lav for andre året på rad. Lav smågnagerbestand medfører vanligvis ekstra stor beskatning på egg og kyllinger fra rev, røyskatt, mår og kråkefugler m.fl. på vår og forsommer. Dette gjelder spesielt i år da smågnagerbestanden kollapser på forsommeren. Den lave beskatningen fra rovdyr i år har trolig sammenheng med at småroviltbestandene er lave siden vi er på andre året med sviktende smågnagerbestand.

I år er det også usedvanlig få rovfugl å se i fjellet som følge av kollapsen i smågnagerbestanden. Voksne stegger og høner er utsatt for å bli tatt av rovfugl i hekkesesongen. Lite nærvær av rovfugl har derfor gitt voksenrypene gode muligheter. Lav rovfuglbestand vil trolig gi langt lavere predasjonen enn normalt på flyvedyktige ryper utover høsten.

Bestandsvurdering

I begge takseringsområdene viser statistikken at stamfuglbestanden er bra. Produksjonen av kyllinger er usedvanlig god. Samlet sett gir dette et resultat som er det nest beste i perioden som vi har takseringsdata for.

15. august 2016

Per Østigård